

# Suite récurrente définie par une fonction

V. Langlet

**Niveau :** APPROFONDIR LA TERMINALE S OU PREMIÈRE ANNÉE POST BAC

**Difficulté :** Exercice classique, simple au début si le cours est su

**Durée :** 1 heure, un peu plus en soignant la rédaction

**Rubrique(s) :** Analyse (Suites récurrentes, fonctions)

---

## Exercice 1.

1) Soit  $A \in \mathbb{R}$  et  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + A$ .

On note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite récurrente définie par

$$u_0 = 0 \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n).$$

a) Donner le tableau de variations de  $f$ .

b) Donner le tableau de signes de  $x \mapsto f(x) - x$  selon la valeur de  $A$  par rapport à  $1/4$ .

c) On dit que l'intervalle  $I$  est stable par  $f$  si et seulement si  $f(I) \subset I$ .  
Montrer que si  $I$  est stable par  $f$  et  $u_0 \in I$ , alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \in I$ .

2) Dans cette question, on suppose  $A \geq 0$ .

a) Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante.

b) Montrer que si  $A > 1/4$ , alors  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tend vers  $+\infty$ .

c) Montrer que si  $A \in [0, 1/4[$ , alors  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge. Donner sa limite.

3) On suppose dans cette question que  $A \in ]-1, 0[$ .

a) Montrer que  $[A, 0]$  est stable par  $f$ .

b) Montrer que  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante et converge vers  $a$  tel que  $f \circ f(a) = a$ .

Montrer que  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante et converge vers  $b$  tel que  $f \circ f(b) = b$ .

c) Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f \circ f(x) - x = (x^2 - x + A)(x^2 + x + A + 1)$ .

d) Montrer que si  $A \in ]-3/4, 0[$ , alors  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent vers la même limite. En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et donner sa limite.

e) Montrer que si  $A \in ]-1, -3/4[$ , alors  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge.

**Indications et Commentaires :** 2.c) On utilisera un intervalle stable par  $f$ .

3.e) On montrera que la suite  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  ne converge pas vers la même limite que la suite  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ .

### Corrections.

**1.a)** Pour tout réel  $x$ , nous définissons  $f(x) = x^2 + A$  avec  $A \in \mathbb{R}$ . La dérivée de la fonction  $f$  vaut, pour tout  $x$ ,  $f'(x) = 2x$ . Le tableau de variations de la fonction  $f$  est donc,

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$0$ $+$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$ $+\infty$
		$A$	

**1.b)** Définissons la fonction  $g$  par, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $g(x) = f(x) - x$ . Sa dérivée vérifie :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g'(x) = f'(x) - 1 = 2x - 1.$$

Le tableau de variations de  $g$  est donc le suivant :

$x$	$-\infty$	$1/2$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$0$	$+$
$g(x)$	$+\infty$	$A - 1/4$	$+\infty$

Si  $A > 1/4$ , d'après le tableau de variations ci-dessus, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on a  $f(x) - x > 0$ .

Si  $A = 1/4$ , alors pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on a  $f(x) - x \geq 0$ .

Si  $A < 1/4$ , alors le tableau de variations de  $g$  est de la forme

$x$	$-\infty$	$\alpha$	$1/2$	$\beta$	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$0$	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$0$	$A - 1/4 < 0$	$0$	$+\infty$

Déterminons  $\alpha$  et  $\beta$ , puisque ces deux valeurs joueront un rôle important par la suite. Ce sont les racines du polynôme  $P = X^2 - X + A$ , si  $A < 1/4$ . On obtient donc :

$$\alpha = \frac{1 - \sqrt{1 - 4A}}{2} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{1 + \sqrt{1 - 4A}}{2}.$$

**1.c)** On démontre ceci par récurrence. Pour tout entier naturel  $n$ , posons  $\mathcal{P}_n$  : " $u_n \in I$ ".

Initialisation :  $u_0 \in I$ , par hypothèse. Donc  $\mathcal{P}_0$  est vraie.

Hérédité : Supposons  $\mathcal{P}_n$  vraie pour un certain entier naturel  $n \geq 0$  et montrons  $\mathcal{P}_{n+1}$ .

Par hypothèse de récurrence, nous avons  $u_n \in I$ . Comme  $u_{n+1} = f(u_n)$  et  $I$  est stable par  $f$ , alors  $u_{n+1} \in I$ . Nous en déduisons que  $\mathcal{P}_{n+1}$  est vraie et on conclut par récurrence.

**2.a)** Si  $A > 1/4$ , la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante car, d'après le tableau de signes de la question 1.b),

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0.$$

Si  $A \in [0, 1/4]$ ,  $I = [0, \alpha]$  est un intervalle stable par  $f$  car  $f$  est croissante sur  $I$  donc

$$f(I) = [f(0), f(\alpha)] = [0, \alpha] = I \quad \text{et en particulier} \quad f(I) \subset I.$$

Comme  $A \leq \alpha$ , par la question 1.c), on a donc pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $u_n \leq \alpha$ . Ainsi la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est également croissante car, d'après le tableau de signes de la question 1.b),


$$\forall n \geq 1, \quad u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0.$$

**2.b)** Supposons que  $u_n$  tende vers une limite  $l$ . Alors  $f(l) = l$  puisque  $f$  continue. Détaillons cet argument :  $u_{n+1} = f(u_n) \rightarrow l$  par continuité de  $f$  en  $l$ . Or  $u_{n+1} \rightarrow l$ , et par unicité de sa limite on obtient


$$f(l) = l, \quad \text{c'est à dire} \quad l = l^2 + A.$$

Mais le polynôme  $P = X^2 - X - A$  n'a pas de racine puisque son discriminant, si  $A > 1/4$ , est  $\Delta = 1 - 4A < 0$ . Ceci est absurde et la suite ne converge donc pas. Pour résumer La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante et ne converge pas, donc elle tend vers l'infini.

Nous pouvons tracer la suite dans le cas  $A = 1$  par exemple. Nous rappelons que le tracé d'une suite récurrente  $u_{n+1} = f(u_n)$  se fait en traçant  $f$  et la première bissectrice  $y = x$ . De cette manière, on part de  $u_0$  en abscisse et on obtient  $u_1$  en prenant l'image par  $f$ . On reporte alors  $u_1$  sur l'axe des abscisses en utilisant la première bissectrice et on recommence... On obtient cet escalier, dont les abscisses successives des points de contact avec  $y = f(x)$  sont les valeurs  $u_0, u_1, u_2, \dots$



**2.c)** Si  $A \in [0, 1/4[$ , le polynôme  $P = X^2 - X - A$  a deux racines  $\alpha$  et  $\beta$ . Remarquons que  $A \leq \alpha$ . Considérons l'intervalle  $I = [0, \alpha]$ .  $I$  est un intervalle stable par  $f$ , donc par la question 1.c), pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n \in I$ .  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante majorée, donc converge vers une limite  $l$  vérifiant  $l = f(l)$ . Dans l'intervalle  $I$ ,  $\alpha$  est l'unique solution vérifiant  $l = f(l)$ , donc  $l = \alpha$ .



**3.a)**  $f$  est décroissante sur  $[A, 0]$ , d'où  $f([A, 0]) \subset [f(0), f(A)] \subset [A, A^2 + A]$ . Plaçons-nous sur  $] - 1, 0[$  et considérons la fonction  $h : x \mapsto x^2 + x$ . On a donc  $h'(x) = 2x + 1$ . Le tableau de variations de  $h$  est

$x$	-1	-1/2	0
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$	0		0
		↘	↗
		-1/4	

Nous en déduisons que  $\forall A \in ] - 1, 0[$ ,  $-1/4 \leq A^2 + A \leq 0$  et donc  $f([A, 0]) \subset [A, 0]$ .

**3.b)** Comme  $f \circ f$  est la composée de deux fonctions décroissantes, elle est croissante. La suite récurrente  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  est donc monotone : on montre cette propriété en utilisant le fait que pour tout entier naturel  $n \geq 2$ ,  $u_{2n+2} - u_{2n} = f \circ f(u_{2n}) - f \circ f(u_{2n-2})$  est de même signe que  $u_{2n} - u_{2n-2}$  puisque  $f \circ f$  est croissante. Ensuite, on démontre par récurrence que  $u_{2n+2} - u_{2n}$  a le même signe que  $u_2 - u_0 = f(A) - 0 \leq 0$ , donc  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante. Comme  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante minorée, elle converge vers un réel  $a$ .  $f \circ f$  étant continue, sa limite vérifie  $f \circ f(a) = a$ . De même,  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers un réel  $b$  tel que  $f \circ f(b) = b$ .

**3.c)** Comme  $(x^2 - x + A)(x^2 + x + A + 1) = x^4 + 2Ax^2 + A^2 - x + A$ , on a pour tout  $x \in \mathbb{R}$


$$f \circ f(x) - x = (x^2 + A)^2 - x + A = x^4 + 2Ax^2 + A^2 - x + A = (x^2 - x + A)(x^2 + x + A + 1).$$

**3.d)** Si  $A \in ]-3/4, 0[$ , il n'y a qu'une seule racine  $\beta$  sur  $[A, 0]$  car :

-  $P = X^2 - X + A$  a deux racines  $\alpha = \frac{1+\sqrt{1-4A}}{2} > 0$  et  $\beta = \frac{1-\sqrt{1-4A}}{2} < 0$ .

-  $Q = X^2 + X + A + 1$ , de discriminant  $\Delta = -3 - 4A$  négatif, est de signe constant positif.

Comme  $u_0 = 0$  et  $[\beta, 0]$  est un intervalle stable par  $f \circ f$ ,  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  décroissante, minorée, converge vers  $\beta$ . Comme  $u_1 = A < \beta$ , et  $[A, \beta]$  est un intervalle stable par  $f \circ f$ ,  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  croissante, majorée, converge vers  $\beta$ . Les suites extraites, paire et impaire, convergent vers la même limite et donc  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\beta$ .




**3.e)** Si  $A \in ]-1, -3/4[$ , il existe trois racines possibles de  $f \circ f(x) - x$  sur  $[A, 0]$  car :

-  $P = X^2 - X + A$  a deux racines  $\alpha = \frac{1+\sqrt{1-4A}}{2} > 0$  et  $\beta = \frac{1-\sqrt{1-4A}}{2} < 0$ .

-  $Q = X^2 + X + A + 1$  a deux racines  $\beta < x_1 = \frac{-1+\sqrt{-3-4A}}{2} \leq 0$  et  $A \leq x_2 = \frac{-1-\sqrt{-3-4A}}{2} < \beta$ .

Comme  $u_0 = 0$  et  $[x_1, 0]$  est un intervalle stable par  $f \circ f$ ,  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  décroissante, minorée, converge vers  $x_1$ . Comme  $u_1 = A < x_2$  et  $[A, x_2]$  est un intervalle stable par  $f \circ f$ ,  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  croissante, majorée, converge vers  $x_2$ . Les deux suites extraites, d'indices pairs et impairs, ne convergent pas vers la même limite et donc  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge.



□